Eine affin - kinematische Erzeugung gewisser Flächen
vierter Ordnung mit zerfallendem Doppelkegelschnitt II

von

Manfred Husty und Otto Röschel

Leoben

In [28] ist es gelungen, Flächen vierter Ordnung $F_4(d_1, d_2)$, deren Doppelkegelschnitt in zwei reelle Geraden d_1 und d_2 zerfällt, nach ihren *Achsenflächen* zu klassifizieren. Danach wurde für gewisse Flächen der Typen 1 und 2 eine *affin - kinematische* Erzeugung angegeben. In dieser Arbeit werden vorerst die in [28] aufgetretenen Zwangläufe spezialisiert; danach wird gezeigt, daß für alle Flächen des Typs 4 eine analoge Erzeugung möglich ist. Hierbei wird die Bezeichnungsweise von [28] konsequent beibehalten; die Numerierung wird lückenlos fortgesetzt.

3. Metrische Sonderformen der in [28] angegebenen Zwangläufe

Die in [28] durch (2.6), (2.8), (2.10), (2.12) und (2.14) erfaßten Zwangläufe besitzen die einheitliche Darstellung

$$\varphi'(u) = \begin{pmatrix} a_{11}(u) & 0 & 0 \\ a_{21}(u) & 1 & 0 \\ \hat{a}_{31}(u) & \alpha \cdot \hat{d}_1(u) & \hat{a}_{33}(u) \end{pmatrix} \varphi^+ \begin{pmatrix} d_1(u) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3.1)$$

wobei $d_1(u)$ und $a_{33}(u)$ ein quadratisches Polynom

$$f(d_1(u), a_{33}(u)) = 0 \quad \forall u \in I \in \mathbb{R} \quad (3.2)$$

erfüllen, und $a_{11}(u)$, $a_{21}(u)$, $a_{31}(u)$, $a_{33}(u)$ sowie $d_1(u)$ beliebige Funktionen der Klasse $C^1(I)$ darstellen. Fordern wir, daß die *Achsenfläche* H ($z' = \alpha \cdot x' \cdot y'$) von (3.1) in sich transformiert wird, so erhalten wir die Bedingungen

$$a_{21}(u) = a_{31}(u) = 0 \quad \text{sowie} \quad a_{11}(u) = a_{33}(u), \quad (3.3)$$

womit (3.1) die Gestalt

$$\varphi'(u) = \begin{pmatrix} a_{33}(u) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha d_1(u) & a_{33}(u) \end{pmatrix} \varphi + \begin{pmatrix} d_1(u) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

erhält. Für die Bahn eines nicht auf H gelegenen Punktes $P(x_0, y_0, z_0)$ ($z_0 \neq \alpha x_0 y_0$) gewinnen wir

$$\begin{cases} x' = x_0 a_{33}(u) + d_1(u) \\ y' = y_0 \\ z' = \alpha d_1(u) y_0 + a_{33}(u) z_0, \end{cases} \quad (3.5)$$

woraus sich

$$d_1(u) = \frac{x' z_0 - z' x_0}{z_0 - \alpha x_0 y_0} \quad \text{und} \quad a_{33}(u) = \frac{z' x_0 - \alpha x' y_0}{z_0 - \alpha x_0 y_0} \quad (3.6)$$

ergibt. Da $d_1(u)$ und $a_{33}(u)$ das quadratische Polynom (3.2) erfüllen, haben wir den

Satz 6: Die durch (3.4) beschriebenen affinen Zwangsläufe

Σ/Σ' führen die nicht auf der Achsenfläche gelegenen Punkte des Gangraumes auf Kurven zweiter Ordnung; Punkte der Achsenfläche H werden auf ihren die Doppelgerade d_2 treffenden Erzeugenden geführt.

Zum Zeitpunkt $u_0 \in I$ gilt

$$\left. \frac{\partial \varphi'(u)}{\partial u} \right|_{u_0} = \dot{\varphi}'(u_0) = \begin{pmatrix} \frac{\dot{a}_{33}(u_0)}{a_{33}(u_0)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha[\dot{d}_1(u_0) - d_1(u_0) \frac{\dot{a}_{33}(u_0)}{a_{33}(u_0)}] & \frac{\dot{a}_{33}(u_0)}{a_{33}(u_0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{d}_1(u_0) - d_1(u_0) \frac{\dot{a}_{33}(u_0)}{a_{33}(u_0)} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3.7)$$

woraus unschwer die Bahnkurven der Momentanbewegung $\mathcal{M}(u_0)$ als

$$\begin{cases} x'(t) = -\beta + (x'_0 + \beta)t \\ y'(t) = y'_0 \\ z'(t) = -\alpha\beta y'_0 + (z'_0 + \alpha\beta y'_0)t \end{cases} \quad \begin{matrix} I \subset \mathbb{R} \\ t \in (-\infty, +\infty) \end{matrix} \quad (3.8)$$

errechnet werden können, wobei abkürzend

$$\beta = \frac{\dot{d}_1(u_0) a_{33}(u_0) - d_1(u_0) \dot{a}_{33}(u_0)}{\dot{a}_{33}(u_0)} \quad (3.9)$$

gesetzt wurde. $\mathcal{M}(u_0)$ führt damit allgemeine Punkte des Gangraumes auf Geraden, die die punktweise festbleibende Doppelgerade d_2 und die Fixpunktgerade

$$f(u_0) \quad \begin{cases} x' + \beta = 0 \\ z' + \alpha\beta y' = 0 \end{cases} \quad (f(u_0) \subset H) \quad (3.10)$$

treffen. Interpretieren wir H als Maßquadratik eines indefinit elliptischen bzw. für $\alpha = 0$ eines indefinit quasielliptischen Raumes (der dann die absoluten Punkte in den Fernpunkten der x' - und der y' -Achse besitzt), so stellt (3.8) eine einparametrische Cliffordsche Schiebungsgruppe dar. Der Bewegungsvorgang (3.4) kann als indefinit elliptische bzw. indefinit quasielliptische Schiebung längs einem geeigneten

Bahnkegelschnitt p_0 aufgefaßt werden, bei der stets die Ferngerade d_2 der Bahnkegelschnittsebene von p_0 punktweise fix bleibt, während die zweite Fixpunktgerade f jene Erzeugendenschar der Achsenfläche H durchläuft, die zu d_2 windschief ist.¹⁾ Die Kegelschnitte der beiden Schieb-scharen sind dabei stets in Tangentialebenen der Maßqua-driken enthalten. Wir haben damit den bemerkenswerten

Satz 7: Die in (3.4) angegebenen Zwangläufe können als Cliffordschiebungen in einem indefinit elliptischen bzw. indefinit quasielliptischen Raum aufgefaßt werden, in dem die Achsenfläche H als Maßquadrik dient. Die Clifford-Schiebung erfolgt im allgemeinen längs Kegelschnitten, deren Ebenen eine auf H gelegene Fixpunktgerade von (3.4) enthalten.

Wir wollen im folgenden versuchen, auch weitere Flächen $F_4(d_1, d_2)$ auf ähnliche Weise zu erzeugen. Dafür kommen die übrigen Flächen $F_4(d_1, d_2)$ des Typs 1 und 2 offensicht-lich nicht in Betracht:²⁾ Da der Startkegelschnitt k_1 den Punkt $D = (d_1, d_2)$ nicht enthält, schneidet die Kegelschnitts-achse den Kegelschnitt k_1 in zwei unter Umständen konjugiert kom-plexen Punkten A und B , die auf der Achsenfläche geführt werden müssen. Andererseits wird gefordert, daß alle Punkte von k_1 in Ebenen durch die Doppelgerade d_2 gewegt werden, was offensichtlich nur dann möglich ist, wenn der Schnitt der Achsenfläche H mit $F_4(d_1, d_2)$ durchwegs aus Geraden besteht.

Auch Flächen des Typs 3 (1.10) lassen sich nicht auf diese Art erzeugen: Ihre Achsenfläche H ist der d_1 und d_2 enthaltende

1) Dieses Ergebnis schließt an das von H. BRAUNER [1] gefundene an; in [1] wurde gezeigt, daß sich für die Zwangläufe $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ in [28] bei der hier vorgenommenen Spezialisierung Cliffordsche Schiebungen in einem indefinit quasielliptischen Raum einstellen.

2) In [28] wurden genau jene Flächen $F_4(d_1, d_2)$ des Typs 1 und 2 kinematisch erzeugt, deren Schnitt mit der Achsenfläche H (1.3) durchwegs aus Geraden besteht.

Kegel zweiter Ordnung (1.9). Der **Startkegelschnitt k_1** enthält den Punkt D und besitzt dort die Hauptachse $a_1 \subset H$ als Tangente. Sollte ein Zwangslauf der angegebenen Art existieren, müßte a_1 in der Ebene $[a_1, d_2]$ gleiten, was aber unmöglich ist, weil a_1 an den nichtzerfallenden Kegel (1.9) gebunden ist.

Da sich herausstellt, daß alle Flächen $F_4(d_1, d_2)$ des Typs 4 eine Erzeugung auf die oben angeführte Art gestatten, wollen wir im folgenden Abschnitt die Flächen dieses Typs etwas genauer studieren.

4. Klassifikation der Flächen $F_4(d_1, d_2)$ vom Typ 4:

Die Normalform dieses Flächentyps lautet gemäß (1.12)

$$x_1^2 x_2^2 + x_0^2 (b_{00} x_0^2 + 2b_{01} x_0 x_1 + b_{11} x_1^2 + 2b_{02} x_0 x_2 + b_{22} x_2^2 + 2b_{12} x_1 x_2) + 2x_0 x_1 x_2 (Ax_1 + Bx_2 + Cx_3) = 0. \quad (C \neq 0) \quad (4.1)$$

Die Achsenfläche H zerfällt in das Ebenenpaar $x_1 x_2 = 0$ und schneidet (4.1) nach d_1, d_2 und den Geraden

$$\begin{cases} x_1 = 0, & b_{00} x_0^2 + 2b_{02} x_0 x_2 + b_{22} x_2^2 = 0 \\ x_2 = 0, & b_{00} x_0^2 + 2b_{01} x_0 x_1 + b_{11} x_1^2 = 0. \end{cases} \quad (4.2)$$

Wir diskutieren nun zwei Fälle getrennt:

- (a) $b_{00} \neq 0$: Die x_3 -Achse (= Schnittgerade der Achsenebenen) liegt nicht auf der Fläche.
- (b) $b_{00} = 0$: Die x_3 -Achse liegt auf der Fläche $F_4(d_1, d_2)$.

Fall a: OBdA. können wir durch Streckung $b_{00} = 1$ erreichen und danach (4.1) in der Gestalt

$$\begin{aligned} & (x_0^2 + 2b_{02} x_0 x_2 + b_{22} x_2^2)(x_0^2 + 2b_{01} x_0 x_1 + b_{11} x_1^2) = \\ & = x_1 x_2 \{ (b_{11} b_{22} - 1) x_1 x_2 + 2x_0^2 \cdot (2b_{01} b_{02} - b_{12}) + 2x_0 \cdot \\ & \cdot [(b_{02} b_{11} - A)x_1 + (b_{02} b_{22} - B)x_2 - Cx_3] \} \end{aligned} \quad (4.3)$$

darstellen, die nach Ausübung der projektiven Kollineation

$$(x_0 : x_1 : x_2 : x_3) \rightarrow (x_0 : x_1 : x_2 : 2x_0(2b_{01}b_{02} - b_{12}) + 2x_1(b_{02}b_{11} - A) + 2x_2(b_{02}b_{22} - B) - 2Cx_3) = (x_0' : x_1' : x_2' : x_3') \quad (4.4)$$

und der Bezeichnung $D = b_{11}b_{22} - 1$ die Normalform

$$x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0^2 + 2b_{02}x_0x_2 + b_{22}x_2^2) \cdot (x_0^2 + 2b_{01}x_0x_1 + b_{11}x_1^2) \quad (4.5)$$

annimmt.

Damit existieren in diesem Fall hinsichtlich der Lage der einzelnen Geraden (4.2) offensichtlich die folgenden

15 Flächentypen :

$$(a1) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0 - x_1)(x_0 - Ax_1)(x_0 - x_2)(x_0 - Bx_2)$$

$$(a2) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0 - x_1)(x_0 - Ax_1)(x_0^2 + (x_0 - Bx_2)^2)$$

$$(a3) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0 - x_1)(x_0 - Ax_1)(x_0 - x_2)^2$$

$$(a4) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0 - x_1)(x_0 - Ax_1)x_0(x_0 - x_2)$$

$$(a5) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = x_0^2(x_0 - x_1)(x_0 - Ax_1)$$

$$(a6) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0^2 + (x_0 - Ax_1)^2)(x_0^2 + (x_0 - Bx_1)^2)$$

$$(a7) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0^2 + (x_0 - Ax_1)^2)(x_0 - x_2)^2$$

$$(a8) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = x_0(x_0^2 + (x_0 - Ax_1)^2)(x_0 - x_2) \quad (4.6)$$

$$(a9) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = x_0^2(x_0^2 + (x_0 - Ax_1)^2)$$

$$(a10) \quad x_1x_2(Dx_1x_2 + x_0x_3) = (x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)^2$$

$$(a11) \quad x_1 x_2 (Dx_1 x_2 + x_0 x_3) = x_0 (x_0 - x_1)^2 (x_0 - x_2)$$

$$(a12) \quad x_1 x_2 (Dx_1 x_2 + x_0 x_3) = x_0^2 (x_0 - x_1)^2$$

$$(a13) \quad x_1 x_2 (Dx_1 x_2 + x_0 x_3) = x_0^2 (x_0 - x_1) (x_0 - x_2)$$

$$(a14) \quad x_1 x_2 (Dx_1 x_2 + x_0 x_3) = x_0^3 (x_0 - x_1)$$

$$(a15) \quad x_1 x_2 (Dx_1 x_2 + x_0 x_3) = x_0^4$$

mit $A, B \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ ³⁾

Für $D \neq 0$ sind diese Flächen im allgemeinen von vierter Ordnung; für $D = 0$ zerfallen die Typen (a4) (a5) (a8) (a9) und (a11) - (a15) - es gibt im Fall a daher 21 verschiedene Flächentypen.⁴⁾

Fall b: $b_{00} = 0$. Die Fläche (4.1) mit $b_{00} = 0$ wird von den Ebenen $x_1 = ux_0$ ($u \in (-\infty, +\infty)$) bzw. $x_2 = vx_0$ ($v \in (-\infty, +\infty)$) nach d_1 bzw. d_2 und den Kegelschnitten

$$\begin{aligned} & x_0^2 [u^2 + 2b_{01}u + b_{11}u^2] + 2x_0 x_2 [b_{02} + b_{12}u + Au^2] + \\ & + x_2^2 [b_{22} + 2Bu] + 2u C x_2 x_3 = 0 \quad \text{bzw.} \end{aligned} \tag{4.7}$$

$$\begin{aligned} & x_0^2 [v^2 + 2b_{02}v + b_{22}v^2] + 2x_0 x_1 [b_{01} + b_{12}v + Bv^2] + \\ & + x_1^2 [b_{11} + 2Av] + 2v C x_1 x_3 = 0 \end{aligned}$$

3) Für $D = 1$ bzw. $D = AB$, $D = AB^2$, $D = A$, $D = A^2 B^2$ zerfallen einige dieser Flächen.

4) A und B bestimmen im wesentlichen das Doppelverhältnis der Schnittgeraden der Fläche mit der Ebene $x_1 = 0$ ($x_2 = 0$), der Achsenebenenschnittgeraden ($x_1 = x_2 = 0$) und der Doppelgeraden d_1 (d_2). Unsere Typeneinteilung enthält damit in einzelnen Fällen sogar eine zweiparametrische Schar von projektiv verschiedenen Flächen, die sich nur durch das oben beschriebene Doppelverhältnis unterscheiden.

geschnitten; die Pole von d_1 bzw. d_2 bezüglich dieser Kegelschnitte liegen auf den Kurven zweiter Ordnung

$$\begin{cases} m_1 \dots x_2 = 0, & b_{02}x_0^2 + b_{12}x_0x_1 + x_1(Ax_1 + Cx_3) = 0 \text{ bzw.} \\ m_2 \dots x_1 = 0, & b_{01}x_0^2 + b_{12}x_0x_2 + x_2(Bx_2 + Cx_3) = 0, \end{cases} \quad (4.8)$$

die durch die projektive Kollineation $(x_0:x_1:x_2:x_3) \rightarrow (x_0':x_1':x_2':x_3')$
 $= (x_0:x_1:x_2:b_{12}x_0 + Ax_1 + Bx_2 + Cx_3)$ - nach Weglassen Striche -
 auf die Normalform

$$\begin{cases} m_1 \dots x_2 = 0 & x_1x_3 + b_{02}x_0^2 = 0 \text{ bzw.} \\ m_2 \dots x_1 = 0 & x_2x_3 + b_{01}x_0^2 = 0 \end{cases} \quad (4.9)$$

transformiert werden können. Als Normalform der Flächengleichung (4.1) mit $b_{00} = 0$ stellt sich somit

$$\begin{aligned} & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) + x_0^2[x_1(2b_{01}x_0 + b_{11}x_1) + x_2(2b_{02}x_0 + \\ & + b_{22}x_2)] = 0 \end{aligned} \quad (4.10)$$

ein. Eine kurze Diskussion der Lage der Geraden (4.2) mit $b_{00} = 0$ ergibt im Fall b die folgenden sechs Normalformen für Flächen dieses Typs:

$$\begin{aligned} (b1) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^2 [x_1(ax_0 - bx_1) + cx_2(x_0 - x_2)] \\ (b2) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^2 [bx_1^2 + cx_2(x_0 - x_2)] \\ (b3) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^2 [ax_0x_1 + cx_2(x_0 - x_2)] \\ (b4) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^2 [bx_1^2 + cx_2^2] \\ (b5) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^2 [bx_0x_1 + cx_2^2] \\ (b6) \quad & x_1x_2(x_1x_2 + 2x_0x_3) = x_0^3 (bx_1 + cx_2) \end{aligned} \quad (4.11)$$

$a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

(b4) ist dabei der bemerkenswerte Sonderfall einer Römerfläche (vgl. [29]), bei der die auf d_1 und d_2 gelegenen Zwickpunkte in D zusammengerückt sind.

Zusammen mit (4.6) haben wir nun den folgenden

Satz 8.: Unter den Flächen $F_4(d_1, d_2)$ vom Typ 4 existieren 27 projektiv verschiedene Flächenklassen, deren Normalformen in (4.6) und (4.11) dargestellt sind.

5. Eine affin-kinematische Erzeugung der Flächen (4.6).

Wir verwenden den Zwanglauf (3.1) und wählen als Bahnkurve p_0 des Punktes $(0, 0, 1)$ den D enthaltenden Kegelschnitt

$$y' = 0, \quad z' = \frac{\beta(x'+1)^2 + \gamma(x'+1) + 1 - \beta - \gamma}{x'+1} \quad (5.1)$$

$\beta, \gamma \in \mathbb{R}$

womit wir (3.1) oBdA in der Gestalt

$$\eta'(u) = \begin{pmatrix} a_{11}(u) & 0 & 0 \\ a_{21}(u) & 1 & 0 \\ a_{31}(u) & \alpha u & \frac{\beta(u+1)^2 + \gamma(u+1) + 1 - \beta - \gamma}{u+1} \end{pmatrix} \eta + \begin{pmatrix} u \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

erhalten. Als Startkegelschnitt k_1 wählen wir den ebenfalls D enthaltenden Kegelschnitt

$$x = 0, \quad z = \frac{\delta y^2 + \epsilon y + \varphi}{y} \quad (\delta, \epsilon, \varphi \in \mathbb{R}) \quad (5.3)!$$

mit in die z -Achse fallender Hauptachse a_1 . Er überstreicht bei (5.2) die Fläche

$$\eta'(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ \alpha uv + \frac{\beta(u+1)^2 + \gamma(u+1) + 1 - \beta - \gamma}{u+1} \cdot \frac{\delta v^2 + \epsilon v + \varphi}{v} \end{pmatrix}, \quad (5.4)$$

deren algebraische Gleichung die Gestalt

r gsublidoA

Abbildung 1

$$(x'+1) y' (z' - \alpha x' y') = [\beta(x'+1)^2 + (x'+1) + 1 - \beta - \gamma] [y'^2 + \epsilon y' + \phi] \quad (5.5)$$

besitzt. Übt man auf (5.5) die Koordinatentransformation

$(x', y', z') \rightarrow (x = x'+1, y = y', z = z' + \alpha y')$ aus, so erhält man

$$xy(z - \alpha xy) = [\beta x^2 + \gamma x + 1 - \beta - \gamma] [\delta y^2 + \epsilon y + \phi], \quad (5.6)$$

woraus im Vergleich mit (4.5) und (4.6) der folgende Satz folgt:

Satz 9.: Alle Flächen (4.6) gestatten die durch (5.2) beschriebene affin-kinematische Erzeugung mit dem Startkegelschnitt k_1 (5.3).

In Abbildung 1 ist die Situation für den Haupttyp in einem axonometrischen Bild dargestellt - allen hier angegebenen Darstellungen liegt ein kartesisches Rechtssystem zugrunde. Hier ~~Abbildung 1~~ erkennen wir die wesentliche Rolle der Fläche zweiter Ordnung

$$\Psi \dots z' = \alpha x' y'. \quad (5.7)$$

Sie enthält so wie H die Doppelgeraden d_1 und d_2 und schneidet aus unserer Fläche $F_4(d_1 d_2)$ im allgemeinen noch ein Vierseit aus,

Abbildung 1

Abbildung 2

dessen Erzeugenden die Schnittpunkte des Startkegelschnittes k_1 und der Bahnkurve p_0 mit Ψ enthalten.⁵⁾ Diese mit der Ausgangsfläche $F_4(d_1, d_2)$ invariant verbundene Fläche zweiter Ordnung Ψ spielt für die in Abschnitt 3 erwähnte Sonderform unserer Zwangläufe genau die Rolle der für Typ 1 und 2 wesentlichen Achsenfläche H . Wir haben damit den

Satz 10.: Die in (5.2) mit $a_{11}(u) = a_{33}(u)$, $a_{21}(u) = a_{31}(u) = 0$ enthaltenen besonderen Zwangläufe können als Clifford-schiebung in einem indefinit elliptischen bzw. indefinit quasielliptischen Raum aufgefaßt werden, in dem die Fläche zweiter Ordnung Ψ als Maßquadrik dient. Die Clifford-schiebung erfolgt im allgemeinen längs zu p_0 kongruenten Kegelschnitten, deren Trägerebenen eine auf Ψ gelegene Fixpunktgerade d_2 von (5.2) enthalten. Die Bahnkurven sind dabei Kegelschnitte, die p_0 in einem Punkt auf d_2 treffen.

Als Beispiel für eine dieser Flächen ist in Abbildung 2 eine axonometrische Darstellung der Fläche (4.6, a10) angegeben; k_1 und p_0 berühren jeweils Ψ .

Abbildung 2

5) Die einzelnen in (4.6) auftretenden Flächentypen unterscheiden sich - wie durch die angegebene Erzeugung besonders deutlich zu erkennen ist - durch die Lage der Kegelschnitte k_1 und p_0 zur Fläche Ψ .

Für $\varphi = 0$ zerfällt der Kegelschnitt k_1 (5.3) in die Geraden $x = y = 0$ und $g \dots x = 0, z = \delta y + \epsilon$, die beim Zwangslauf (5.4) die Fläche (5.5) mit $\varphi = 0$ überstreichen. Die entstehende Fläche zerfällt somit in die Ebene $y' = 0$ (Bahnebene von $x = y = 0$) und in eine Regelfläche dritter Ordnung. Schneidet g die Fläche Ψ in einem eigentlichen Punkt W , so entsteht eine zum Plücker'schen Konoid projektiv-kollineare Fläche, die d_1 als Doppelgerade und die Bahngerade von W als Leitgerade besitzt. Ist die Startgerade g zu Ψ parallel, so entsteht eine CAYLEY'sche Regelfläche; liegt g auf Ψ , so entsteht nur Ψ selbst. Auf dieselben Regelflächen dritter Ordnung führt die Annahme, daß der Leitkegelschnitt p_0 , nicht aber der Startkegelschnitt k_1 zerfällt.

Abbildung 3 zeigt den Fall, in dem p_0 in zwei Gerade zerfällt, von denen eine z -parallel ist. $(\beta = 1, \gamma = 0 \text{ in (5.1)})$

Die entstehende Regelfläche ist zu einem PLÜCKER'schen Konoid projektiv-kollinear.

Abbildung 3

Abbildung 3

6. Eine affin-kinematische Erzeugung der Flächen (4.11)

Ein möglicher affiner Zwangslauf der Ebene $x = 0$ kann hier o. B. d. A. in der Normalform dadurch festgelegt werden, daß wir als Bahn des Punktes $U(0, 0, 0)$ die x' -Achse, als Bahn des Punktes $(0, 0, 1)$ die Gerade

$$\mathcal{U}' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \alpha \in \mathbb{R} \\ \lambda \in (-\infty, +\infty) \end{matrix} \quad (6.1)$$

und als Bahn des Punktes $(0, 1, 0)$ die Hyperbel

$$p_0 \dots y' = 1 \quad z' = \beta \frac{(x+1)^2 - 1}{x+1} \quad \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (6.2)$$

wählen und wieder die Forderung stellen, daß die Bahnkurven aller Punkte der Ebene $x = 0$ in zur $[x' z']$ -Ebene parallelen Ebenen verlaufen sollen. Der Zwangslauf (2.2) erhält damit die Gestalt

$$\mathcal{U}'(u) = \begin{pmatrix} a_{11}(u) & 0 & 0 \\ a_{21}(u) & 1 & 0 \\ a_{31}(u) & \beta \frac{(u+1)^2 - 1}{u+1} & 1 + \alpha u \end{pmatrix} \mathcal{U} + \begin{pmatrix} u \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (6.3)$$

mit beliebigen Funktionen $a_{11}(u), a_{21}(u), a_{31}(u) \in C^1(I)$

Unterwerfen wir die Starthyperbel

$$k_1 \dots x = 0, z = \frac{\delta(y+1)^2 + \varphi}{y+1} \quad \delta, \varphi \in \mathbb{R} \quad (6.4)$$

diesem Zwangslauf, so entsteht eine Fläche mit der Parameterdarstellung

Abbildung 4

$$\varrho'(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ \beta v \frac{(u+1)^2 - 1}{u+1} + (\lambda + \alpha u) \frac{\delta (v+1)^2 + \varphi}{v+1} \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

und der algebraischen Gleichung

$$\begin{aligned} z'(x'+1)(y'+1) &= (1 + \alpha x')(x'+1)[\delta(y'+1)^2 + \varphi] + \\ &+ \beta(y'+1)y'[(x'+1)^2 - 1]; \end{aligned} \quad (6.6)$$

die entstehende Fläche ist somit im allgemeinen eine Fläche vierter Ordnung, die unter anderem für $\alpha\delta + \beta = 0$ zerfällt.

Für $\alpha\delta + \beta \neq 0$ gelingt es, (6.6) mit der affinen Transformation

$$\begin{aligned} (x', y', z') &\longrightarrow (x^* = x'+1, y^* = y'+1, \\ z^* &= - \frac{z' + \beta(x'+1) - \delta(1-\alpha)(y'+1)}{2(\beta + \alpha\delta)} \end{aligned}$$

auf die Normalform

$$x^*y^*[2z^* + x^*y^*] = Ax^*[1 - \alpha + \alpha x^*] + By^*(1 - y^*) \quad (6.7)$$

zu bringen, wobei abkürzend

$$A = - \frac{\varphi}{\beta + \alpha\delta} \quad \text{und} \quad B = - \frac{\beta}{\beta + \alpha\delta} \quad (6.8)$$

gesetzt wurde. Wir sind somit in der Lage, durch Wahl der Konstanten α , β , δ und φ alle Flächen der Typen (b1), (b2) und (b3) in (4.11) auf die gewünschte Art kinematisch zu erzeugen.

Für $\beta = 0$ zerfällt p_0 (6.2); wir erhalten jene Regelflächen dritter Ordnung, die bereits in Abschnitt 5 aufgetreten sind.

Abbildung 4 zeigt als Beispiel die Fläche (6.7) mit $\alpha = 0$, $A = 0,5$, $B = 1$

Wählen wir die Starthyperbel k_1 derart, daß eine Asymptote in die z -Achse fällt (ihre Punkte beschreiben dann im allgemeinen Geraden als Bahnkurven), so können wir $oBdA$

$$k_1 \dots \quad x = 0, \quad z = \delta \frac{y^2 - 1}{y} \quad (6.9)$$

setzen. k_1 überstreicht beim Zwanglauf (6.3) die Fläche mit der Parameterdarstellung

$$\psi'(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ \beta \frac{(u+1)^2 - 1}{u+1} v + (1+\alpha u) \delta \frac{v^2 - 1}{v} \end{pmatrix} \quad (6.10)$$

und der algebraischen Gleichung

$$\begin{aligned} (x'+1)y'z' &= \delta(1+\alpha x')(x'+1)(y'^2-1) + \\ &+ \beta y'^2[(x'+1)^2-1], \end{aligned} \quad (6.11)$$

die für $\beta + \alpha\delta \neq 0$ eine Fläche vierter Ordnung darstellt. Für $\beta + \alpha\delta \neq 0$ bringt die affine Transformation

$$\begin{aligned} (x', y', z') &\longrightarrow (x^* = x'+1, y^* = y', z^* = \\ &= \frac{z' - y'\delta(1-\alpha)}{2(\beta + \alpha\delta)}) \end{aligned} \quad (6.12)$$

(6.11) auf die Normalform

$$x^* y^* (2z^* + x^* y^*) = bx^* [1-\alpha + \alpha x^*] + cy^{*2}, \quad (6.13)$$

wobei wir abkürzend

$$b = \frac{\beta}{\beta + \alpha\delta}, \quad c = \frac{\delta}{\beta + \alpha\delta} \quad (6.14)$$

Abbildung 5

gesetzt haben. Ein Vergleich mit (4.11) zeigt, daß wir für $\alpha = 1$, den Typ (b4) und für $\alpha = 0$ den Typ (b5) gewinnen. Für $\alpha(\alpha-1) \neq 0$ erhalten wir eine zweite Erzeugungsmöglichkeit des Typs (b2).

Ein interessantes Beispiel zeigt die Abbildung 5, wobei eine anscheinend bisher noch nicht bekannte Erzeugungsmöglichkeit einer Römerfläche angegeben wird.

Abbildung 5

Für bestimmte Sonderformen von Römerflächen hat W. WUNDERLICH euklidisch-kinematische Modelle vorgestellt (vgl. [29] und [30]), denen nun affin-kinematische zur Seite gestellt werden können.

Der letzte noch fehlende Flächentyp (4.11, (b6)) trägt neben der Doppelgeraden d_1 , d_2 und der z -Achse keine weiteren Geraden. Um dennoch eine affin-kinematische Erzeugung zu erhalten, versuchen wir den Kegelschnitt k_1

$$k_1 \dots x = 1, \quad z = \frac{\alpha + \beta y - y^2}{2y} \quad (6.15)$$

in der gewünschten Weise auf der Fläche (4.11, (b6)) zu bewegen. Dabei müssen die Punkte A , $\bar{A}$ $(1, \pm 1, \frac{\beta \pm \alpha + 1}{2})$ sowie B $(1, 2, \frac{\alpha + 2\beta - 4}{4})$ auf den Kegelschnitten

Abbildung 6

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{a, } \bar{a} \dots y = \pm 1, \quad z = \frac{\beta - \alpha x + x^2}{2x} \text{ sowie} \\ \text{b } \dots y = 2, \quad z = \frac{2\beta + \alpha x - 4x^2}{4x} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \alpha\beta \neq 0 \\ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{array} \quad (6.16)$$

geführt werden, womit sich der Zwanglauf

$$\psi'(u) = \begin{pmatrix} a_{11}(u) & 0 & 0 \\ a_{21}(u) & 1 & 0 \\ a_{31}(u) & -\frac{u}{2} & 1 \end{pmatrix} \psi + \begin{pmatrix} u + 1 - a_{11}(u) \\ -a_{21}(u) \\ -\frac{\beta u}{2(u+1)} - a_{31}(u) \end{pmatrix} \quad u \in \mathbb{R} \quad (6.17)$$

einstellt. Dabei sind $a_{11}(u)$, $a_{21}(u)$ und $a_{31}(u)$ willkürliche Funktionen der Klasse $C^1(\mathbb{R})$. Der Startkegelschnitt k_1 (6.15) überstreicht bei diesem Zwanglauf die Fläche

$$\psi'(u, v) = \begin{pmatrix} u + 1 \\ v \\ -\frac{uv}{2} + \frac{\alpha + \beta v - v^2}{2v} - \frac{\beta u}{2(u+1)} \end{pmatrix}, \quad (6.18)$$

deren algebraische Gleichung mit (4.11 (b6)) übereinstimmt.

Abbildung 6 zeigt eine axonometrische Darstellung der Fläche (4.11 b6) mit $b = c = 0,25$.

Abbildung 6

Damit haben wir den

Satz 11.: Die Flächen $F_4(d_1, d_2)$ des Typs 4 lassen sich durch die Zwangläufe (5.2), (6.5) und (6.17) affin-kinematisch erzeugen. Bei diesen Zwangläufen wird ein Flächenkegelschnitt k_1 aus dem Ebenenbüschel um die Doppelgerade d_1 so bewegt, daß die Flächenkegelschnitte aus dem Ebenenbüschel um d_2 die Bahnkurven der Punkte von k_1 abgeben.

7. Metrische Sonderformen der in Abschnitt 6 bestimmten
Zwangläufe

Betrachten wir vorerst den Zwanglauf (6.3): Mit der
Zusatzforderung, daß alle Punkte der Doppelgeraden d_2
Fixpunkte sein sollen, erhalten wir (6.3) in der Gestalt

$$\dot{\varphi}'(u) = \begin{pmatrix} 1 + \alpha u & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \beta \frac{(u+1)^2 - 1}{u+1} & 1 + \alpha u \end{pmatrix} \varphi' + \begin{pmatrix} u \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.1)$$

Zum Zeitpunkt $u = u_0$ gilt

$$\dot{\varphi}'(u) = \begin{pmatrix} \alpha A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & B & \alpha A \end{pmatrix} \varphi' + \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (7.2)$$

wobei abkürzend

$$A = \frac{1}{1 + \alpha u_0} \quad \text{und} \quad B = \beta \left[\frac{(u_0 + 1)^2 + 1}{(u_0 + 1)^2} - \alpha \frac{(u_0 + 1)^2 - 1}{(u_0 + 1)(1 + \alpha u_0)} \right] \quad (7.3)$$

gesetzt wurde.

Die Momentanbewegung (7.2) besitzt für $\alpha \neq 0$ die Bahnkurven

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{1}{\alpha} + \left(x + \frac{1}{\alpha}\right) e^t \\ y'(t) = y \\ z'(t) = -\frac{B}{\alpha A} y + \left(z + \frac{B}{\alpha A} y\right) e^t. \end{cases} \quad (\alpha \neq 0) \quad (7.4)$$

Diese Bahnkurven sind im allgemeinen Geraden, die die Fix-
punktsgeraden d_2 und

$$f(u_0) \begin{cases} x + \frac{1}{\alpha} = 0 \\ z + \frac{B}{\alpha A} y = 0 \end{cases} \quad (7.5)$$

treffen. Faßt man u_0 als Parameter auf, so durchläuft die Fixpunktgerade $f(u_0)$ das in der Ebene $\Psi : x = -\frac{1}{\alpha}$ gelegene Strahlbüschel durch den Punkt $F = (\frac{1}{\alpha}, 0, 0)$.

Ψ und F sind mit den Flächen (6.5) bzw. (6.6) auf folgende Weise invariant verbunden: Ψ ist jene die Doppelgerade d_1 enthaltende Ebene, die die Ausgangsfläche $F_4(d_1, d_2)$ durchwegs nach Geraden schneidet und nicht mit der Fernebene ω oder einer Achsenflächenebene identisch ist. Der Punkt F ist der Schnittpunkt der beiden Geraden der Fläche, die den Punkt $D = (d_1, d_2)$ nicht enthalten.⁶⁾ Die Flächen lassen sich demnach als Schiebflächen in einem indefinit quasielliptischen Raum deuten, wobei F und D als absolute Punkte und Ψ sowie $[d_2F]$ als absolute Ebenen dienen.

Für $\alpha = 0$ (Flächentyp (4.11, (b3))) besitzt die Momentanbewegung (7.2) die Bahnkurven

$$\begin{cases} x'(t) = t + x \\ y'(t) = y \\ z'(t) = Bty + z, \end{cases} \quad (7.6)$$

die wieder Geraden sind. Diese Geraden sind nun in einem parabolischen Netz um die Doppelgerade d_2 enthalten, wobei die Fernebene ω als Zielpunkt den Punkt $D = (d_1, d_2)$ besitzt. Fassen wir $\{D, d_2, \omega\}$ als Absolutgebilde eines Flaggenraumes $I_3^{(2)}$ auf (vgl. H. BRAUNER [27] und H. SACHS [20]), so sind die Momentanbewegungen "Nichtisotrope Cliffordschiebungen" (vgl. H. BRAUNER [27, S. 130]); der besondere Zwanglauf ist somit eine nichtisotrope Cliffordschiebung längs Kegelschnitten in einem geeignet gewählten Flaggenraum $I_3^{(2)}$.

6) Die einzige Ausnahme stellt der Fall $\alpha = 1$ dar; hier fällt die sonst zur Achsenebene $x = -1$ parallele Ebene Ψ mit dieser Achsenebene zusammen. F wird zum Schnittpunkt $(0, 1, 0)$ der y -Achse mit der Fläche.

Diese Schiebnetze sind dadurch gekennzeichnet, daß sie stets das in ω gelegene Strahlbüschel mit dem Träger D und das in der Ebene $y = 0$ gelegene Strahlbüschel mit dem Fernpunkt der x-Achsen als Träger enthalten.

Fordert man auch beim Zwanglauf (6.17), daß die Doppelgerade d_2 punktweise festbleiben soll, so erhält man

$$\varphi'(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{u}{2} & 1 \end{pmatrix} \varphi + \begin{pmatrix} u + 1 \\ 0 \\ -\frac{\beta u}{2(u+1)} \end{pmatrix}. \quad (7.7)$$

Wieder sind die Bahnkurven aller Punkte des Gangraumes im allgemeinen Kegelschnitte in Ebenen durch die Doppelgerade d_2 . Als Momentanbewegung stellt sich zum Zeitpunkt u_0 die Transformationsgruppe

$$\psi'(u_0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \psi + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\beta}{2(u_0+1)^2} \end{pmatrix} \quad (7.8)$$

ein; sie besitzt die Bahnkurven

$$\begin{aligned} x'(t) &= t + x \\ y'(t) &= y \\ z'(t) &= \left(-\frac{y}{2} - \frac{\beta}{2(u_0+1)^2}\right)t + z \end{aligned} \quad (7.9)$$

Es handelt sich dabei im allgemeinen um Geraden, die in einem parabolischen Netz um die Ferngerade d_2 enthalten sind, wobei dem Punkt D das in ω gelegene Strahlbüschel durch D entspricht. Die Momentanbewegung kann daher mit [27, S. 130] wieder als nichtisotrope Cliffordschiebung in einem Flaggenraum $I_3^{(2)}$ mit dem Absolutgebilde $\{D, d_2, \omega\}$ aufgefaßt werden. Diese Schiebnetze sind im Gegensatz zu den in (7.6) auftretenden wie folgt gekennzeichnet : Die Bahngeraden von (7.9) sind in Ebenen ($y = \text{konst.}$)

durch d_2 enthalten und treffen die Ferngerade d_2 in den diesen Ebenen zugeordneten Punkten $(0:1:0:-\frac{y}{2} - \frac{\beta}{2(u_0+1)^2})$. Im Flaggenraum $\mathbb{I}_3^{(2)}$ gilt nach [27] für das Verhältnis des Abstands der Punkte $(0:1:0:-\frac{y_i}{2} - \frac{\beta}{2(u_0+1)^2})$ zum isotropen Winkel der entsprechenden Ebenen $y = y_i$ ($i=1,2$)

$$\delta(u_0) = -\frac{1}{2}. \quad (7.10)$$

Wir haben damit den

Satz 12.: Die in (6.3) mit $a_{11}(u) = a_{33}(u)$, $a_{21}(u) = a_{31}(u) = 0$, $\alpha \neq 0$ enthaltenen metrisch besonderen Zwangläufe lassen sich als Cliffordschiebungen in einem indefinit quasielliptischen Raum mit D bzw. F als absoluten Punkten und Ψ bzw. $[d_2, F]$ als absoluten Ebenen auffassen.

Die in (6.3) mit $a_{11}(u) = a_{33}(u)$, $a_{21}(u) = a_{31}(u) = \alpha = 0$ und die in (6.17) mit $a_{11}(u) = a_{33}(u)$, $a_{21}(u) = a_{31}(u) = 0$ enthaltenen besonderen Zwangläufe sind nichtisotrope Clifforschiebungen in einem Flaggenraum mit dem Maßgebilde $\{D, d_2, \omega\}$.

LITERATUR:

[1] - [26] in [28]

- [27] BRAUNER, H.: Geometrie des zweifach isotropen Raumes I, II, III. J. Reine Angew. Math. 224, 118 - 146 (1966), 226, 132 - 158 (1967), 228, 38 - 70 (1967).
- [28] HUSTY, M. und RÖSCHEL, O.: Eine affin-kinematische Erzeugung gewisser Flächen vierter Ordnung mit zerfallendem Doppelkegelschnitt I. Glasnik Mat. (eingereicht)
- [29] WUNDERLICH, W.: Über zwei durch Zylinderrollung erzeugbare Modelle der Steinerschen Römerfläche. Archiv Math. 18, 325 - 336 (1967).
- [30] WUNDERLICH, W.: Durch Schiebung erzeugbare Römerflächen. Sitzungsber., Österr. Akad. Wiss., 176, 473 - 497 (1967).

Anschrift der Verfasser : Manfred HUSTY und Otto RÖSCHEL,
Institut für Mathematik und Angewandte Geometrie, MU -
Leoben, Franz - Josef - Straße 18, A - 8700 Leoben, AUSTRIA.